

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ  
14 ФЕВ 2018

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению Монтебана® 100 для профилактики кокцидиоза  
у цыплят-бройлеров

(Организация-разработчик: «Eli Lilly and Company», 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, USA / «Эли Лилли энд Компани», 2500 Инновэйшн Вэй, г. Гринфилд, штат Индиана, 46140, США)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Монтебан® 100 (Monteban® 100).  
Международное непатентованное наименование: наразин.
2. Лекарственная форма: гранулы для орального применения.  
Монтебан® 100 в 1 кг в качестве действующего вещества содержит наразин – 100 г, а также вспомогательные вещества: соевое или минеральное масло и оболочки рисовых зерен.
3. По внешнему виду препарат представляет собой гранулы серо-коричневого цвета.  
Срок годности Монтебана® 100 при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства.  
Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.
4. Выпускают препарат расфасованным по 25 кг в герметично закрытых многослойных бумажных мешках.
5. Хранят Монтебан® 100 в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°C до 25°C.
6. Хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Монтебан® 100 относится к антикокцидийным лекарственным препаратам группы ионофоров. Активен в отношении внеклеточных бесполой форм (спорозиты, мерозиты) *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. necatrix*, *E. tenella*, паразитирующих у птиц.
10. Антикокцидийное действие наразина, входящего в состав лекарственного препарата, обусловлено его воздействием на состояние калий-натриевого равновесия и нарушением осмотического баланса в клетке паразита, что приводит к гибели кокцидий.

Наразин практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и проявляет свое кокцидиостатическое действие на слизистой и подслизистой оболочках кишечника. Выводится из организма птиц преимущественно в неизменном виде с помётом.

По степени воздействия на организм Монтебан® 100 относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

### III. Порядок применения

11. Монтебан® 100 применяют для профилактики кокцидиоза у цыплят-бройлеров.

12. Запрещается применение лекарственного препарата индейкам и животным других видов.

13. Монтебан® 100 применяют цыплятам-бройлерам в смеси с кормом в дозе 0,7 кг на 1 тонну корма (70 г наразина на 1 тонну корма). Может применяться с первого дня жизни в течение всего периода выращивания. Исключают лекарственный препарат из рациона за 1 сутки до убоя.

Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу Монтебана® 100 смешивают с небольшим количеством корма (20-50 кг) и затем, при тщательном перемешивании, вносят в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

14. При передозировке препарата у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Запрещается применение лекарственного препарата курам-несушкам.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы, применение препарата необходимо возобновить как можно скорее, в той же дозе и по той же схеме.

18. При применении Монтебана® 100 согласно настоящей инструкции побочных явлений и осложнений не установлено.

19. Не допускается использование Монтебана® 100 одновременно с другими антикокцидийными средствами, совместно с тиамулином и тролеандомицином, а также за 7 суток до начала и в течение 7 суток после окончания их применения.

20. Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается не ранее, чем через 1 сутки после окончания применения Монтебана® 100. Мясо птиц, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

### IV. Меры личной профилактики

21. При работе Монтебаном® 100 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Все работы с Монтебаном® 100 необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

22. Во время работы запрещается пить, принимать пищу и курить. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки, рот прополоскать водой.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей. Упаковочный материал складывают в специально отведенных местах и утилизируют с бытовыми отходами.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Монтебаном® 100. При случайном попадании препарата на кожные покровы или в глаза их необходимо промыть большим количеством проточной воды, при вдыхании препарата – следует вывести пострадавшего на свежий воздух. В случае развития аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм

человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения:

«Eli Lilly and Company, Clinton Laboratories»,  
10500 South State Road 63, Clinton, Indiana  
47842-0099, USA/ «Эли Лилли энд Компани,  
Клинтон Лабораториес», 10500 Соуз Стэйт  
Роуд 63, Клинтон, штат Индиана 47842-0099,  
США.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной владельцем или  
держателем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя:

ООО «Эланко Рус», 123112, Россия, г. Москва,  
Пресненская набережная, 10.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по  
применению Монтебана 100, утвержденная Россельхознадзором 06 августа 2014 г.

Номер регистрационного удостоверения 840-3-1.18-4030 N1784-3-2.9/02853